レジメン名称	催吐リスク分類	コース	処方薬	投与量	スケジ	ュー	ル														
					Day	1	••	8	••	15	••	22	••	29	••	36	••	56	1	••	
5-FULV	軽度	1コース8週間	レボホリナート	250 mg/m^2		1		1		1		1		1		1			1		
			5-FU	600 mg/m^2		1		1		1		1		1		1			1		
					Day	1	• •	8	••	15	••	22	••	29	• •	36	••	56	1	• •	
5-FU/LV+ベバ	±⊽ 	1コース8週間	ベバシズマブ	5 mg/kg		1				1				1							
シズマブ	軽度	コー人の週间	レボホリナート	250 mg/m^2		1		1		1		1		1		1			1		
			5-FU	600 mg/m^2		1		1		1		1		1		1			1		
CPT-11	中等度	 1コース4週間			Day	1	••	• •	8	• •	••	15	••	• •	22	••	28	1	• •		
CPT-II	中守反	1コーク4週间	イリノテカンA法	100 mg/m^2		1			1			1						1			
CPT-11		1コ―ス5週間			Day	1	••	••	8	• •	••	15	• •	22	••	29	••	35	1	• •	
GP1-11		コースの週間	イリノテカンB法	150 mg/m^2		1						1							1		
					Day	1	••	••	8	••	14	1	••								
	中等度	2週間に1回	レボホリナート	200 mg/m^2		1						1									
FOLFIRI			イリノテカン	180 mg/m^2		1						1									
			5-FU	400 mg/m^2		1						1									
			5-FU	2400 mg/m^2		1						1									
					Day	1	••	••	8	••	14	1	••								
			ベバシズマブ	5 mg/kg		1						1									
FOLFIRI+ベバシ	中等度	2週間に1回	レボホリナート	200 mg/m^2		1						1									
ズマブ	中寺 /支	2週间101日	イリノテカン	180 mg/m^2		1						1									
			5-FU	400 mg/m^2		1						1									
			5-FU	2400 mg/m^2		1						1									
					Day	1	••	• •	8	••	14	1	••								
			サイラムザ	8 mg/kg		1						1									
FOLFIRI+サイラ	中等度	2週間に1回	レボホリナート	200 mg/m^2		1						1									
ムザ	中 守皮	∠週间1〜1円	イリノテカン	180 mg/m^2		1						1									
			5-FU	400 mg/m^2		1						1									
			5-FU	2400 mg/m^2		1						1									

イリノテカン:180では副作用強いため、150に設定している施設有

レジメン名称	催吐リスク分類	コース	処方薬	投与量	スケジュール
					Day 1 · · · 8 · · 14 1 · ·
			ザルトラップ	4 mg/kg	↑
FOLFIRI+ザルト	<i>!\!\</i>		レボホリナート	200 mg/m^2	\uparrow
ラップ	中等度	2週間に1回	イリノテカン	180 mg/m^2	↑
			5-FU	400 mg/m ²	↑
			5-FU	2400 mg/m ²	↑
				2100 1118/111	Day 1 · · · 8 · · 14 1 · ·
			ベクティビックス	6 mg/kg	↑ ↑ ↑
FOLFIRI+ベク			レボホリナート	200 mg/m ²	<u> </u>
ティビックス	中等度	2週間に1回	イリノテカン	180 mg/m ²	
, , , , , , ,			5-FU	400 mg/m ²	1 ↑
				<u> </u>	
			5-FU	2400 mg/m ²	
			 /// /= ± \	400 . 2	Day 1 · · · · 8 · · · · 15 · · · · 22 · · 28 1 · ·
IRIS	中等度	1コース4週間	イリノテカン	180 mg/m^2	
			TS-1	80mg/m2/日 1日2回	↑ ↑ ↑ · · · · ↑ ↑
					タ朝タ
					Day 1 · · · · 8 · · · · 15 · · · · 22 · · 28 1 · ·
IRIS+ベバシズ			ベバシズマブ	5 mg/kg	\uparrow \uparrow
マブ	中等度	1コース4週間	イリノテカン	100 mg/m^2	\uparrow \uparrow
			TS-1	80mg/m2/日 1日2回	↑ ↑↑ •• •• ↑↑ ↑
					タ朝タ
					Day 1 ·· ·· 8 ·· ·· 15 ·· ·· 22 ·· 28 1 ··
			ベクティビックス	6 mg/kg	↑
IRIS+ベクティ ビックス	中等度	1コース4週間	イリノテカン	100 mg/m^2	↑
			TS-1	80mg/m2/日 1日2回	↑ ↑ ↑ · · · · ↑ ↑
					タ朝タ
					Day 1 · · · 8 · · 14 1 · ·
			レボホリナート	200 mg/m^2	<u> </u>
mFOLFOX6	中等度	2週間に1回	オキサリプラチン	_	↑
			5-FU	400 mg/m ²	↑
			5-FU	2400 mg/m ²	· ↑
			1010	ZTOO IIIB/ III	1

レジメン名称	催吐リスク分類	コース	処方薬	投与量	スケジュール
					Day 1 · · · 8 · · 14 1 · ·
			ベバシズマブ	5 mg/kg	↑
mFOLFOX6+ベ	中等度	2週間に1回	レボホリナート	200 mg/m^2	↑
バシズマブ	中守及	2週间1~1日	オキサリプラチン	85 mg/m^2	↑
			5-FU	400 mg/m^2	↑
			5-FU	2400 mg/m^2	\uparrow \uparrow
					Day 1 · · · 8 · · 14 1 · ·
			ベクティビックス	6 mg/kg	↑
mFOLFOX6+ベ	中等度	2週間に1回	レボホリナート	200 mg/m^2	↑
クティビックス	甲寺及	∠週间1~1円	オキサリプラチン	85 mg/m^2	↑
			5-FU	400 mg/m^2	↑
			5-FU	2400 mg/m^2	↑
					Day 1 ·· · · 8 ·· · · 15 ·· 21 1 ··
			イリノテカン	150 mg/m^2	↑
SIR	中等度	1コース3週間	TS-1	80~120mg/m2/日	↑ ↑ ↑ •• •• ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
			13 1	1日2回	
					タ 朝 タ
					Day 1 ·· · · 8 ·· · · 15 ·· 21 1 ··
			ベバシズマブ	7.5 mg/kg	\uparrow \uparrow
SIRB	中等度	1コース3週間	イリノテカン	150 mg/m^2	\uparrow \uparrow
	, , ,		TS-1	80~120mg/m2/日	↑ ↑ ↑ · · · · ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
				1日2回	
					タ 朝 タ
			. 18 1	200	Day 1 · · · 8 · · 14 1 · ·
sLV5FU2	軽度	2週間に1回	レボホリナート	200 mg/m^2	
			5-FU	$400~\text{mg/m}^2$	
			5-FU	2400 mg/m ²	
				F //	Day 1 · · · 8 · · 14 1 · ·
sLV5FU2+べバ		0.田田1-4 🗔	ベバシズマブ	5 mg/kg	
シズマブ	軽度	2週間に1回	レボホリナート	200 mg/m^2	
			5-FU	400 mg/m^2	
			5-FU	2400 mg/m^2	T

レジメン名称	催吐リスク分類	コース	処方薬	投与量	スケジュール
sox	中等度	3週間に1回	オキサリプラチン TS-1	85 mg/m² 80mg/m2/日 1日2回	Day 1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
SOX+ベバシズ マブ	中等度	3週間に1回	ベバシズマブ オキサリプラチン TS-1	7.5 mg/kg 130 mg/m² 80mg/m2/日 1日2回	Day 1 ··· ·· 8 ··· 15 ··· 21 1 ···
SOX+ベクティ ビックス	中等度		ベクティビックス オキサリプラチン TS-1		Day 1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
XELIRI	中等度	3逈间[⊂]归		200 mg/m ² 1600mg/m2/日 1日2回	Day 1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

イリノテカン: 150mg/m2(UGT1A1:*6ホモ、*28ホモ、*6及び*28ダブルへテロの場合の開始量)

					Day 1 · · · 8 · · · 1	5 •• 21 1 ••	
VELIDI " . " . 7"			ベバシズマブ	7.5 mg/kg	↑	↑	
XELIRI+ベバシズ マフ゛	中等度	3週間に1回	イリノテカン	200 mg/m^2	↑	↑	
			カペシタビン	1600mg/m2/日 1日2回	↑ ↑↑ ↑↑ ↑	↑ ↑ ↑	
					ター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	タ	

					Day 1 •	• • 8		15 •• 21	1 ••
VELIDI: \$ 4 = .			ベクティビックス	9 mg/kg	1				1
XELIRI+ベクティ ビックス	中等度	3週間に1回	イリノテカン	200 mg/m^2	1				1
			カペシタビン	2000mg/m2/日 1日2回	↑ ↑		•• ↑ ↑	↑	↑ ↑ ↑
					タ		阜	明	タ

イリノテカン: 150mg/m2(UGT1A1:*6ホモ、*28ホモ、*6及び*28ダブルヘテロの場合の開始量)

レジメン名称	催吐リスク分類	コース	処方薬	投与量	スケジ	ュー	ル									
					Day	1	••	• •	8	• •	• •	15	••	21	1	••
VEL 0.V	<i>**</i> - ** -		オキサリプラチン	130 mg/m^2		1									1	
XELOX	中等度	3週間に1回	カペシタビン	2000mg/m2/日 1日2回		1	1 1				1 1	1			1	↑ ↑
				_		タ						朝			タ	
					Day	1			8			15		21	1	
			ベバシズマブ	7.5 mg/kg		1									1	
XELOX+ベバシ ズマブ	中等度	3週間に1回	オキサリプラチン			1									1	
^ < /			カペシタビン	2000mg/m2/日 1日2回		1	1 1				1 1	1			1	↑ ↑
						タ						朝			タ	
					Day	1	••	••	8		••		••	21	1	••
			ベクティビックス	9 mg/kg		1									1	
XELOX+ベクティ	中等度	3週間に1回	オキサリプラチン	130 mg/m^2		1									1	
ビックス			カペシタビン	2000mg/m2/日 1日2回		1	1 1				1 1	1			1	↑ ↑
						タ						朝			タ	
					Day	1	••		8			15		21	1	
7 134.47			アービタックス	初回400mg/m²、		1			1			1			1	
アービタックス+ ゼローダ	最少度	1コース3週間	J — L 3997	2回目以降250mg/m ²		1			ı			ı			'	
			カペシタビン	2000mg/m2/日 1日2回		1	1 1	••	••	• •	1 1	1			1	↑ ↑
						タ						朝			タ	
					Day	1	••	7	1	• •						
アービタックス+	最少度	1コース1週間	アービタックス	初回400mg/m²、		1			1							
ビラフトビ				2回目以降250mg/m ²					' •							
			ビラフトビ	300mg/日 1日1回	_	<u>T</u>	T	<u>T</u>	<u>T</u>	<u>T</u>						
				±7.55 400 mm / 2	Day	1	••	7	1	••	••	15	••	21	1	••
アービタックス+ ビラフトビ+メクト ビ			アービタックス	初回400mg/m²、		1			1			1			1	
	最少度	1コース1週間	ビラフトビ	2回目以降250mg/m ² 300mg/日 1日1回		1	1	↑	1	1						
			メクトビ	90mg/日 1日1日 90mg/日 1日2回		I ↑	I ↑ ↑			٠.						
				Johns Jach		」 夕	1 1	- •								
						ツ										

レジメン名称	催吐リスク分類	コース	処方薬	投与量	スケジ	<u>_</u>	-ル														
					Day	1	• •	8	• •	15	• •	22		29		36	• •	42	1	••	
ベバシズマブ+TSー		4— — 0 12 12 12 12 12 12 12	ベバシズマブ	5 mg/kg		1				1				1					1		
1	最少度	1コース6週間	TS-1	80mg/m2/日 1日2回		1	1 1						↑ ↑	1					1	1 1	
				5		タ								朝					夕		
					Day	1	••	••	8	••	••	15	••	•••	22		28	1	•		
			ベバシズマブ	5 mg/kg		1			1			1						1			
ヘ゛ハ゛シス゛マフ゛	最少度	1コース4週間		300mg/m2/日 1日3回		↑	1 1							1 1	1			↑	1 1		
+UFT UZEL	42.7.2			75mg/日 1日3回		' ↑	1 1							1 1	↑			•	· ·		
			OZLL	/Jillg/ L TLJE		夕	' '							' '	朝			夕	' '		
						2						1 -		0.1				9			
				 "	Day	<u></u>	••		8	••	••	15	••	21	<u> </u>	•••					
へ、バシス、マフ、+カへ。	最少度	1コース3週間	ベバシズマブ	7.5 mg/kg		١															
シタヒン			カペシタビン	2000mg/m2/日 1日2回		Î	1 1	••	••	••	1 1	•			•	1 1					
						タ						朝			タ						
					Day	1	••	••	••	6	••	8	••	••	••	13	••	15	••	28	1
ヘ゛ハ゛シス゛マフ゛+ロン	最少度	1コース4週間	ベバシズマブ	5 mg/kg		1												1			1
サーフ	取少皮	コーク4週間	ロンサーフ	70mg/m2/日 1日2回		1	1 1	••	1 1	1		1	1 1	••	1 1	1					\uparrow \uparrow \uparrow
						タ				朝		タ				朝					タ
ベカニノビックフ	旦小庄	0,周間1-1日			Day	1	••	••	8	••	14	1	• •								
ベクティビックス	最少度	2週間に1回	ベクティビックス	6 mg/kg		1						1									
					Day	1			8		14	1									
ベクティビックス +CPT-11	中等度	2週間に1回	ベクティビックス	6 mg/kg		1						1									
TOP1-11			イリノテカンA法	150 mg/m^2		1						1									