

レジメン名称	催吐リスク分類	コース	処方薬	投与量	スケジュール
DOC 食道癌	軽度	3週間に1回	ドセタキセル	70 mg/m ²	Day 1 8 15 .. 21 1 .. ↑ ↑
IP 食道癌	高度	1コース4週間	イリノテカン シスプラチン	60 mg/m ² 60 mg/m ²	Day 1 8 15 22 .. 28 1 .. ↑ ↑ ↑
GEM+DOC 平滑筋腫	軽度	1コース3週間	ゲムシタビン ドセタキセル	900 mg/m ² 100 mg/m ²	Day 1 8 15 .. 21 1 .. ↑ ↑ ↑
R-CHOP リンパ腫	高度	3週間に1回	リツキサン エンドキサン アドリアシン オンコビン プレドニゾン錠	375 mg/m ² 750 mg/m ² 50 mg/m ² 1.4 mg/m ² 100mg/日 1日2回	Day 1 2 .. 6 .. 8 15 .. 21 1 2 .. ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ .. ↑ ↑ ..

リツキサン:最大8回まで

DOC体腔(胸腔・ 腹腔等)内投与	軽度	2回投与で終了	ドセタキセル	60 mg/m ²	Day 1 8 15 .. ↑ ↑
キイトルーダ 固形癌	最少度	3週間に1回	キイトルーダ	200 mg/回	Day 1 8 15 .. 21 1 .. ↑ ↑
FP 肛門癌	高度	1コース4週間	シスプラチン 5-FU	80 mg/m ² 800 mg/m ²	Day 1 2 3 4 5 6 7 28 1 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑